

## Písomná informácia pre používateľa

**CELSENTRI 25 mg filmom obalené tablety**  
**CELSENTRI 75 mg filmom obalené tablety**  
**CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety**  
**CELSENTRI 300 mg filmom obalené tablety**  
maravirok

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je CELSENTRI a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELSENTRI
3. Ako užívať CELSENTRI
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CELSENTRI
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### 1. Čo je CELSENTRI a na čo sa používa

CELSENTRI obsahuje liečivo nazývané maravirok. Maravirok patrí do skupiny liečiv nazývaných *antagonisty CCR5*. CELSENTRI účinkuje tak, že blokuje receptor nazývaný CCR5, pomocou ktorého HIV vstupuje do krvných buniek a infikuje ich.

**CELSENTRI sa používa na liečbu infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti typu 1 (HIV-1) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 2 rokov a s telesnou hmotnosťou aspoň 10 kg.**

CELSENTRI sa musí užívať v kombinácii s inými liekmi, ktoré sa tiež používajú na liečbu infekcie HIV. Všetky tieto lieky sa nazývajú *lieky proti HIV* alebo *antiretrovirotiká*.

CELSENTRI, ako súčasť kombinovanej liečby, znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Týmto pomáha telu zvyšovať počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo dôležité tým, že mu pomáhajú bojovať s infekciou.

### 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELSENTRI

**Neužívajte CELSENTRI**

- ak ste vy alebo vaše dieťa (ak je pacientom) **alergickí** na maravirok alebo na arašidy alebo sóju alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek CELSENTRI (*uvedených v časti 6*).

➔ Ak si myslíte, že sa to týka vás alebo vášho dieťaťa, **poradte sa so svojím lekárom.**

## Upozornenia a opatrenia

Váš lekár vám alebo vášmu dieťaťu (ak je pacientom) musí odobrať vzorku krvi, aby overil, či je CELSENTRI pre vás alebo pre vaše dieťa vhodným liekom.

U niektorých ľudí, ktorí užívali CELSENTRI, vznikli závažné alergické reakcie alebo kožné reakcie (pozri aj „Závažné vedľajšie účinky“ v časti 4).

Predtým ako začnete užívať tento liek, presvedčte sa, že váš lekár vie, že vy alebo vaše dieťa máte alebo ste v minulosti mali ktorékoľvek z nasledujúceho:

- problémy s **pečeňou** vrátane chronickej **hepatitídy B** alebo C. CELSENTRI užíval iba obmedzený počet osôb s problémami s pečeňou. Môže byť potrebné pozorné sledovanie funkcie pečene (pozri aj „Problémy s pečeňou“ v časti 4).
  - **nízky krvný tlak** vrátane závratov pri rýchlom postavení sa alebo posadení sa a/alebo že užívate lieky na zníženie krvného tlaku. Závraty sú spôsobené náhlym poklesom krvného tlaku. Ak sa u vás vyskytnú, ľahnite si a zostaňte ležať, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Ak sa chcete znovu postaviť, robte to čo najpomalšie.
  - **tuberkulózu (TB)** alebo závažné **mykotické (plesňové) infekcie**. CELSENTRI môže u vás alebo u vášho dieťaťa potenciálne zvýšiť riziko vzniku infekcií.
  - problémy s **obličkami**. Toto je zvlášť dôležité, ak vy alebo vaše dieťa užívate aj niektoré ďalšie lieky (pozri aj „Iné lieky a CELSENTRI“ nižšie v časti 2).
  - **problémy so srdcom alebo s krvným obehom**. CELSENTRI užíval iba obmedzený počet osôb so závažnými problémami so srdcom alebo s krvným obehom.
- ➔ Ak si myslíte, že sa vás alebo vášho dieťaťa a ktorékoľvek z uvedeného týka, **povedzte to svojmu lekárovi** pred začatím liečby.

### Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

U niektorých ľudí, ktorí užívajú lieky proti infekcii HIV, vzniknú ďalšie zdravotné ťažkosti, ktoré môžu byť závažné. Medzi ne patria:

- príznaky infekcie a zápalu,
- bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov a problémy s kosťami.

Musíte poznať významné prejavy a príznaky, aby ste si na ne mohli dávať pozor počas užívania CELSENTRI.

➔ **Prečítajte si informáciu „Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV“ v časti 4 tejto písomnej informácie.**

### Chráňte iných ľudí

Infekcia HIV sa prenáša pohlavným stykom s osobou nakazenou touto infekciou alebo sa prenáša nakazenou krvou (napríklad pri použití rovnakých ihl). Infekciu HIV môžete vy alebo vaše dieťa preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná liečba toto riziko znižuje.

➔ Poradte sa so svojím lekárom o tom, ako zabrániť nakazeniu iných ľudí.

### Staršie osoby

CELSENTRI užíval iba obmedzený počet osôb vo veku 65 rokov alebo starších. Ak patríte do tejto vekovej skupiny, poradte sa so svojím lekárom, či môžete užívať CELSENTRI.

### Deti

Použitie CELSENTRI sa neskúmalo u detí mladších ako 2 roky alebo s telesnou hmotnosťou nižšou ako 10 kg. Z toho dôvodu sa CELSENTRI neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky alebo s telesnou hmotnosťou nižšou ako 10 kg.

## Iné lieky a CELSENTRI

**Ak vy alebo vaše dieťa teraz užívate** alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, **povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.**

Ak počas užívania CELSENTRI vy alebo vaše dieťa začnete užívať nový liek, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky, ktoré obsahujú **Pubovník bodkovaný** (*Hypericum perforatum*), pravdepodobne bránia správne účinkovaniu CELSENTRI. **Počas liečby liekom CELSENTRI ich neužívajte.**

Niektoré lieky môžu zmeniť množstvo CELSENTRI v tele, keď sa užívajú v rovnakom čase ako CELSENTRI. Medzi ne patria:

- iné lieky na liečbu infekcie **HIV** alebo infekcie spôsobenej vírusom **hepatitídy C** (napríklad . atazanavir, kobicistat, darunavir, efavirenz, etravirín, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, boceprevir, telaprevir)
  - **antibiotiká** (klaritromycín, telitromycín, rifampicín, rifabutín)
  - lieky proti **plesňovým infekciám** (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
  - **antikonzulzíva** (čo sú lieky na liečbu epilepsie alebo záchvatov kŕčov, napríklad karbamazepín, fenytoín, fenobarbital).
- ➔ Ak vy alebo vaše dieťa užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, **povedzte to svojmu lekárovi.** Váš lekár tak bude môcť predpísať správnu dávku CELSENTRI.

## Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť:

➔ **porad'te sa so svojim lekárom** o rizikách a prínosoch užívania CELSENTRI.

## Dojčenie

**Ženy, ktoré sú HIV-pozitívne, nesmú dojčiť**, pretože infekcia HIV sa môže cez materské mlieko preniesť na dieťa.

Nie je známe, či zložky obsiahnuté v CELSENTRI môžu prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte alebo ak uvažujete o dojčení:

➔ bezodkladne sa **porozprávajte so svojim lekárom.**

## Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CELSENTRI u vás môže vyvolať závraty.

➔ **Neved'te vozidlá, nejazdite na bicykli, nepoužívajte nástroje ani neobsluhujte stroje**, pokiaľ si nie ste istý, že na vás takto nepôsobí.

## CELSENTRI obsahuje sójový lecitín.

Ak ste vy alebo vaše dieťa alergickí na sóju alebo arašidy, neužívajte tento liek.

### **3. Ako užívať CELSENTRI**

Vždy užívajte alebo podávajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár vám poradí, či je lepšie užívať perorálny roztok CELSENTRI, ak vy alebo vaše dieťa nedokážete prehltnúť tablety.

#### **Aké množstvo užívať**

##### **Dospelí**

Odporúčaná dávka CELSENTRI je **150 mg, 300 mg alebo 600 mg dvakrát denne** v závislosti od iných liekov, ktoré užívate v rovnakom čase. Vždy užívajte dávku, ktorú vám odporučil váš lekár.

##### **Osoby s problémami s obličkami**

Ak máte problémy s obličkami, váš lekár vám môže upraviť dávku.

➔ Ak sa vás to týka, **poradíte sa so svojim lekárom.**

##### **Dospievajúci a deti vo veku od 2 rokov a s telesnou hmotnosťou aspoň 10 kg**

Váš lekár určí správnu dávku CELSENTRI v závislosti od telesnej hmotnosti a od iných liekov užívaných v rovnakom čase.

**CELSENTRI sa môže užívať s jedlom alebo nalačno.** CELSENTRI sa vždy musí užívať ústami.

CELSENTRI sa musí užívať v kombinácii s inými liekmi na liečbu infekcie HIV. Odporúčania na užívanie týchto liekov si prečítajte v príslušných písomných informáciách pre používateľov.

#### **Ak užijete alebo podáte viac CELSENTRI, ako máte**

Ak náhodou užijete alebo podáte priveľké množstvo CELSENTRI:

➔ **ihneď sa obráťte na svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice.**

#### **Ak zabudnete užiť alebo podať CELSENTRI**

Ak vy alebo vaše dieťa vynecháte dávku CELSENTRI, užite alebo podajte túto zabudnutú dávku čo najskôr a potom pokračujte užitím alebo podaním ďalšej dávky vo zvyčajnom čase.

Ak sa však blíži čas užitia alebo podania ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte. Počkejte do užitia alebo podania ďalšej dávky vo zvyčajnom čase.

**Neužívajte alebo nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.**

#### **Ak vy alebo vaše dieťa prestanete užívať CELSENTRI**

Pokračujte v užívaní CELSENTRI, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Je dôležité, aby ste vaše lieky užívali v správnom čase každý deň, keďže to zaisťuje, aby sa infekcia HIV vo vašom tele nezhoršovala. Preto je dôležité, aby ste vy alebo vaše dieťa pokračovali v správnom užívaní CELSENTRI tak, ako je to uvedené vyššie, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

#### 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavajú u každého. Informujte svojho lekára, ak si všimnete na svojom zdravotnom stave alebo na zdravotnom stave vášho dieťaťa čokoľvek nezvyčajné.

##### **Závažné vedľajšie účinky – ihneď vyhľadajte lekársku pomoc**

##### **Závažné alergické alebo kožné reakcie**

U niektorých ľudí, ktorí užívali CELSENTRI, vznikli závažné a život ohrozujúce kožné reakcie a alergické reakcie. Tieto reakcie sú zriedkavé a môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb, ktoré užívajú CELSENTRI.

Ak sa u vás počas užívania CELSENTRI vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

- opuch tváre, pier alebo jazyka
- ťažkosti s dýchaním
- rozsiahla kožná vyrážka
- horúčka (vysoká teplota)
- pľuzgier alebo olupovanie kože, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov

➔ **ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Prestaňte užívať CELSENTRI.**

##### **Problémy s pečeňou**

Sú zriedkavé a môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb, ktoré užívajú CELSENTRI.

Medzi ich prejavy patria:

- strata chuti do jedla
- pocit na vracanie alebo vracanie
- ožltnutie kože alebo očí
- kožná vyrážka alebo svrbenie
- pocit silnej únavy
- bolesť brucha alebo citlivosť brucha na dotyk
- tmavý moč
- ospalosť alebo zmätenosť
- horúčka (vysoká teplota).

➔ Ak sa u vás vyskytnú uvedené príznaky, **ihneď sa obráťte na lekára. CELSENTRI prestaňte užívať.**

##### **Ďalšie vedľajšie účinky**

##### **Časté vedľajšie účinky**

Môžu postihovať **menej ako 1 z 10 osôb**:

- hnačka, pocit na vracanie, bolesť žalúdka, plynatosť (*flatulencia*)
- nechutenstvo
- bolesť hlavy, problémy so spánkom, depresia
- vyrážka (*pozri aj „Závažné alergické alebo kožné reakcie“ vyššie v časti 4*)
- pocit slabosti alebo nedostatku energie, málokrvnosť (prejavená vo výsledku krvných testov)
- zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov (prejavené vo výsledkoch krvných testov), ktoré môže byť príznakom problémov s pečeňou (*pozri aj „Problémy s pečeňou“ vyššie v časti 4*).

### **Menej časté vedľajšie účinky**

Môžu postihovať **menej ako 1 zo 100 osôb**:

- infekcia pľúc
- hubová infekcia pažeráka (*ezofágu*)
- záchvaty kŕčov (epileptické záchvaty)
- závraty, mdloby alebo pocit točenia pri postavení sa
- zlyhanie obličiek, prítomnosť bielkoviny v moči
- zvýšenie množstva látky nazývanej kreatínfosfokináza (CPK) (prejavené vo výsledkoch krvných testov), čo je príznakom zápalu alebo poškodenia svalov.

### **Zriedkavé vedľajšie účinky**

Môžu postihovať **menej ako 1 z 1 000 osôb**:

- bolesť na hrudníku (spôsobená zníženým prívodom krvi do srdca)
- úbytok svalovej hmoty
- niektoré typy rakoviny, napríklad rakovina pažeráka (*ezofágu*) a žlčovodu
- pokles počtu krviniek (prejavený vo výsledkoch krvných testov).

### **Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV**

U ľudí, u ktorých je infekcia HIV liečená kombinovanou liečbou, sa môžu vyskytnúť ďalšie vedľajšie účinky.

### **Príznaky infekcie a zápalu**

Ľudia s pokročilou infekciou HIV (AIDS) majú oslabený imunitný systém a sú náchylnejší na vznik závažných infekcií (*oportúnnych infekcií*). Po začatí liečby imunitný systém zosilnie, a tak telo začne bojovať s infekciami.

Môžu sa objaviť **príznaky infekcie a zápalu**, ktoré sú spôsobené:

- buď znovuvzplanutím predchádzajúcich, skrytých infekcií, s ktorými telo bojuje,
- alebo tým, že imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivá (*autoimunitné poruchy*).

**Príznaky autoimunitných porúch** sa môžu objaviť mnoho mesiacov po tom, ako začnete užívať liek na liečbu infekcie HIV. Príznaky môžu zahŕňať:

- svalovú slabosť
- slabosť začínajúcu sa v rukách a nohách a postupujúcu smerom k trupu
- palpitácie (rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca) alebo tremor (chvenie rúk)
- hyperaktivitu (nadmerný nepokoj alebo nadmernú pohyblivosť).

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky infekcie alebo ak spozorujete ktorýkoľvek z príznakov uvedených vyššie:

➔ **ihneď to povedzte svojmu lekárovi.** Neužívajte iné lieky proti infekcii, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

### **Bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov a problémy s kosťami**

U niektorých ľudí, u ktorých je infekcia HIV liečená kombinovanou liečbou, vznikne ochorenie nazývané *osteonekróza*. Pri tomto ochorení dochádza k odumretiu častí kostného tkaniva následkom zníženého prítoku krvi do kostí.

Nie je známe, ako často sa toto ochorenie vyskytuje. Môžete byť náchylnejší na vznik tohto ochorenia:

- ak ste dlhodobo liečený kombinovanou liečbou
- ak užívate aj protizápalové lieky nazývané kortikosteroidy
- ak požívate alkohol
- ak je váš imunitný systém veľmi oslabený
- ak máte nadváhu.

### **Medzi príznaky, na ktoré si treba dávať pozor, patria:**

- stuhnutosť kĺbov
- bolesti kĺbov (hlavne v bedrách, kolene alebo ramene)
- ťažkosti s pohybom.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov:

➔ **povedzte to svojmu lekárovi.**

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk). Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať CELSENTRI**

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte CELSENTRI po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri alebo na označení fľašky. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo CELSENTRI obsahuje**

- Liečivo v CELSENTRI je maravirok. Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg, 75 mg, 150 mg alebo 300 mg maraviroku.
- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, škrobový glykolát sodný, magnéziumstearát

Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, sójový lecitín, indigokarmín E132.

### **Ako vyzerá CELSENTRI a obsah balenia**

CELSENTRI filmom obalené tablety sú modrej farby s nápisom „MVC 25“, „MVC 75“, „MVC 150“ alebo „MVC 300“.

CELSENTRI 25 mg a 75 mg filmom obalené tablety sa dodávajú vo fľaškách po 120 tabliet. CELSENTRI 150 mg a 300 mg filmom obalené tablety sa dodávajú vo fľaškách po 180 tabliet alebo v blistroch po 30, 60, 90 filmom obalených tabliet a vo viacnásobných baleniach obsahujúcich 180 (2 balenia po 90) filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii**

ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, Holandsko.

### **Výrobca**

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Nemecko.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

#### **België/Belgique/Belgien**

ViiV Healthcare sprl/bvba  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

#### **Lietuva**

GlaxoSmithKline Lietuva UAB  
Tel: + 370 5 264 90 00  
info.lt@gsk.com

#### **България**

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  
Тел.: + 359 2 953 10 34

#### **Luxembourg/Luxemburg**

ViiV Healthcare sprl/bvba  
Belgique/Belgien  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

#### **Česká republika**

GlaxoSmithKline s.r.o.  
Tel: + 420 222 001 111  
cz.info@gsk.com

#### **Magyarország**

GlaxoSmithKline Kft.  
Tel.: + 36 1 225 5300

#### **Danmark**

GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Tlf: + 45 36 35 91 00  
dk-info@gsk.com

#### **Malta**

GlaxoSmithKline Malta  
Tel: + 356 21 238131

#### **Deutschland**

ViiV Healthcare GmbH  
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10  
vii.v.med.info@viihealthcare.com

#### **Nederland**

ViiV Healthcare BV  
Tel: + 31 (0)30 6986060  
contact-nl@viihealthcare.com

#### **Eesti**

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: + 372 6676 900  
[estonia@gsk.com](mailto:estonia@gsk.com)

#### **Norge**

GlaxoSmithKline AS  
Tlf: + 47 22 70 20 00

#### **Ελλάδα**

GlaxoSmithKline A.E.B.E.  
Τηλ: + 30 210 68 82 100

#### **Österreich**

GlaxoSmithKline Pharma GmbH  
Tel: + 43 (0)1 97075 0  
at.info@gsk.com

#### **España**

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.  
Tel: + 34 902 051 260  
es-ci@viihealthcare.com

#### **Polska**

GSK Services Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

#### **France**

ViiV Healthcare SAS

#### **Portugal**

VIIIV HIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,



Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969  
Infomed@viivhealthcare.com

**Hrvatska**

GlaxoSmithKline d.o.o.  
Tel: + 385 1 6051 999

**Ireland**

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
Tel: + 353 (0)1 4955000

**Ísland**

Vistor hf.  
Sími: + 354 535 7000

**Italia**

ViiV Healthcare S.r.l.  
Tel: + 39 (0)45 9212611

**Κύπρος**

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd  
Τηλ: + 357 22 39 70 00  
gskcyprus@gsk.com

**Latvija**

GlaxoSmithKline Latvia SIA  
Tel: + 371 67312687  
[lv-epasts@gsk.com](mailto:lv-epasts@gsk.com)

**LDA.**

Tel: + 351 21 094 08 01  
viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

**România**

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  
Tel: + 4021 3028 208

**Slovenija**

GlaxoSmithKline d.o.o.  
Tel: + 386 (0)1 280 25 00  
medical.x.si@gsk.com

**Slovenská republika**

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.  
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11  
recepacia.sk@gsk.com

**Suomi/Finland**

GlaxoSmithKline Oy  
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30  
Finland.tuoteinfo@gsk.com

**Sverige**

GlaxoSmithKline AB  
Tel: + 46 (0)8 638 93 00  
info.produkt@gsk.com

**United Kingdom**

ViiV Healthcare UK Ltd  
Tel: + 44 (0)800 221441  
customercontactuk@gsk.com

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 10/2018.**

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky  
<http://www.ema.europa.eu/>.